Org.nr.: 924 118 016
Tlf.nr.: 97 32 32 30
Epost: kontakt@blaerekreftnorge.no
https://blaerekreftnorge.no
Postadr.: Gamle Hadelandsv. 72, 2023 Maura
Bankkonto: 3207.30.45648

- Over 17 000 nordmenn lever i dag med sykdommen (CIN 2025: 17 108)
- 70% er menn, 30% er kvinner
- 1 900 nye tilfeller diagnostiseres årlig (CIN 2025: 1928). Av disse er ca. 40-50 personer under 50 år
- Ca. 450 dødsfall årlig (CIN 2025: 451)
- 5. hyppigste kreftform blant menn i alle aldre (etter prostata-, hud-, tykktarms- og lungekreft), den 7. totalt
- blærekreftpasientene er sykehusenes dyreste kreftpasienter
- samfunnet bruker mer penger totalt på å behandle blærekreft enn f.eks. prostatakreft

Kilde for tallgrunnlag: Kreftregisterets årlige publikasjon Cancer in Norway (CIN).

Hvem rammes?

I tillegg til at 30 - 50% av tilfellene blir forklart med røyking, påviser STAMI-rapport nr. 3/2010 og en rekke andre kilder overhyppighet av blærekreft i yrker som

grafikere
verkstedarbeidere
aluminiumsarbeidere
tekstilarbeidere
gummiarbeidere
feiere
sjåfører
fiskere
rørleggere
sjømenn
petroleumsarbeidere
tobakksarbeidere
emballasjearbeidere
servitører
mannlige frisører
helsearbeidere o.a som jobber med stråling

Det vanligste symptomet på blærekreft er synlig blod i urinen eller andre vannlatingsendringer. Omtrent 70% av de nydiagnostiserte har en mild form av sykdommen som kan behandles operativt med et inngrep gjennom urinrøret (transurethral reseksjon, TUR-B), men det er likevel stor risiko for at nye svulster dukker opp i blæra senere. Pasientene må av den grunn gjennom et omfattende og ressurskrevende kontrollregime i mange år, ofte resten av livet.

Overfladisk blærekreft som residiverer (kommer igjen og igjen) behandles med instillasjoner av BCG-løsninger (tuberkel-basiller) eller cellegift i tillegg til kirurgisk fjerning.

Ubehandlet blærekreft kan gå over i en muskelinvasiv form, og pasienten har da bare 50% sjanse for å overleve de neste 5 årene. De pasientene som diagnostiseres i en tidlig fase har en overlevelse på 94-95%. 5-års overlevelse for samtlige pasienter er 80,7% for menn og 73,5% for kvinner (2021-25).

Behandling for avansert blærekreft er ofte fjerning av hele blæra (cystektomi), en livsendrende behandling som påvirker både pasienten selv og familien i stor grad. I tillegg kan det gis cellegift, immunterapi eller stråling hvis sykdomsutviklingen tilsier det. De siste årene har kombinasjonsbehandlinger med cellegift og immunterapi blitt innført som et nytt behandingstilbud til en selektert gruppe blærekreftpasienter.

Ta gjerne kontakt for ytterligere referanser eller kilder, samt utdyping eller presisering.